

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ АНТИБИОТИКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ САМОЛЕЧЕНИЯ МУЖЧИНАМИ

Головенко Е.В., Шемет Т.О., Кузьмина А.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Республика Беларусь

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Научный руководитель – д.м.н, проф. Тищенко Е.М.

Актуальность. Любое лекарственное средство обладает двойным действием: при правильном назначении и в нужных дозах оно полезно, при неоправданном применении и в неправильных дозах оно может оказаться вредным и даже опасным. При самолечении антибиотиками существует опасность использования неправильных доз и назначения слишком короткого или слишком длительного курса лечения. Это может привести к различным осложнениям [1,2].

Целью данного исследования явилось изучение характера выбора антибиотиков для самолечения среди анкетированных.

Материалы и методы исследования. Нами было проанкетировано 107 мужчин. С последующим распределением их по возрасту, месту жительства и образованию. Городское население составило 78%, сельское – 22%. Большинство пациентов относилось к возрастным группам 19-29 – 35,51% и 40-49 – 26,17%. Высшее образование имеют 40%, треть (31%) среднее-специальное, одна пятая часть – незаконченное высшее, около 9% – среднее.

Результаты. Более половины мужчин (74%) принимают антибиотики самостоятельно, без инструкции врача. Только 26% мужчин применением консультируются с врачом.

Мужчины наиболее часто для лечения используют следующие антибиотики: амоксициллин, амоксиклав – 39,25%, цефтриаксон используют 15,89%, кларитромицин, эритромицин – 14,95% респондентов. Реже все используют меропенем и левомецетин по 0,93% соответственно.

Вывод. Большинство мужчин и занимаются самолечением, не консультируясь с врачом по поводу приема антибиотиков. Наиболее распространенными антибиотиками оказались группы пенициллина (амоксиклав, амоксициллин) и цефалоспорины (цефтриаксон, цефазолин). Редко используют респонденты меропенем и левомецетин. Антибиотики должен назначать только врач по определенным показаниям. Выбор антибиотика зависит от характера и тяжести заболевания, а также от того, какие препараты пациент получал ранее.

Литература.

1. Deschepper R, Lundborg CS, Monnet DL, Scicluna EA, Birkin J, Haaijer-Ruskamp FM, SAR consortium (2007) Attitudes, beliefs and knowledge concerning antibiotic use and self-medication: a comparative European study. *Pharmacoepidemiol and Drug Safety*. 16:1234-43.
2. World Health Organization (2000) Guidelines for the regulatory assessment of Medicinal Products for use in self-medication. WHO/EDM/QSM/00.1.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ ПРИЕМЕ АНТИБИОТИКОВ

Головенко Е.В., Шемет Т.О., Кузьмина А.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Республика Беларусь

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Научный руководитель – д.м.н, проф. Тищенко Е.М.

Актуальность. Антибиотики как и другие лекарственные препараты имеют свои побочные эффекты, поэтому неправильный и необоснованный прием увеличивают риск их развития. Контроль за доступностью использования антибиотиков имеет существенные отличия в разных странах и играет важную роль в надлежащем использовании антибиотиков. Так например в странах Европы имеется большая распространенность самолечения антибиотиками, по данным опроса 75% взрослого населения принимают не предписанные им врачом антибактериальные препараты [1,2,3,4].