

Выводы: На основе полученных результатов можно сделать вывод, что вполне возможно подобрать более дешевые лекарственные препараты по сравнению с оригинальными, опираясь лишь на минимальные знания о некоторых латинских и английских терминах, в которых отражается значение данного препарата.

Литература

1. Медпортал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://apteka.103.by/>. – Дата доступа: 03.02.2017.
2. «Таблетка Бай» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.tabletka.by/>. – Дата доступа: 02.02.2017.

ДИНАМИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Сапего А.Н.

*Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Беларусь
Научный руководитель: к. психол. н., доцент Карнелович М.М.*

Актуальность. С каждым годом из-за динамичности мира профессий проблема её выбора становится всё более актуальной для старшеклассника. Выбор профессионального будущего осуществляется старшеклассником не только на основе способностей, склонностей интересов учащихся, но и с учётом потребностей общества в специалистах того или иного профиля, степени престижности профессии в современных социально-экономических условиях. Выявление динамики профессиональных намерений старшеклассников с 9-го по 11-е классы является актуальным для мониторинга профессионального самоопределения личности в юношеском возрасте.

Цель: определить динамику профессионально-ориентационных установок старшеклассников разного пола. В исследовании приняли участие 78 учащихся УО «Средняя школа №3 г. Гродно». Из них 27 человек – учащиеся 9-х классов, 30 – учащиеся 10-х классов и 21 – учащиеся 11-х классов.

Методы исследования: методика диагностики «Определение типа будущей профессии» (Е.А. Климова); методика профессионального самоопределения (Дж. Холланда); методы описательной статистики; критерий U-Манна-Уитни, содержательная интерпретация полученных данных.

Результаты. Для юношей 9-х классов наибольший интерес представляют профессии типа «человек-техника»; учащиеся отдают также предпочтение занятиям, требующим применения физической силы, ловкости, ориентированы в основном на практический труд. Юноши 10-х классов предпочитают профессии типа «человек-знаковая система», выбирают профессии, связанные с канцелярскими и расчётными работами, установлением количественных соотношений между числами, системами условных знаков. При этом они ориентированы также на труд, главным содер-

жанием которого является взаимодействие с другими людьми, возможность решать задачи, предполагающие анализ поведения и обучения людей. Юноши 11-х классов также выбирают профессии типа «человек-знаковая система», однако больше предпочитают деятельность, требующую организаторских способностей, связанную с руководством, управлением и влиянием на разных людей в разных ситуациях. Девушки 9-11 классов отдают предпочтение профессиям типа «человек-человек» и «человек-художественный образ», причем к выпускному классу средней школы они теряют интерес к тем профессиям, в которых общение не является ведущим в структуре деятельности, и выбирают те, которые требуют постоянного контакта и общения с людьми.

Выводы. Существуют значимые различия в динамике профессиональных ориентаций у юношей и девушек 9-11-х классов.

ХИРУРИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ СТОПЫ

Сарвас М. А., Савко И. С., Волк Л. Л.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., доцент Кузнецов А.Г.*

Актуальность. Прогрессивный рост заболеваемости, связанной с сахарным диабетом (СД) и облитерирующим атеросклерозом (ОА), часто осложняющимися различными гнойно-некротическими поражениями стопы (ГНПС) обуславливает актуальность изучения данной проблемы.

Цель. Провести анализ этиологических и клинико-морфологических данных, а также результатов лечения пациентов с ГНПС, вследствие сахарного диабета (СД) и облитерирующего атеросклероза (ОА).

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни пациентов с ГНПС, вследствие СД и ОА, находившихся на лечении хирургическом отделении УЗ «ГКБСМП г. Гродно» за последние 3 года (с 2014 по 2016 г.г.).

Результаты и обсуждение. Всего находилось на лечении 120 пациентов. Из них ГНПС диабетического генеза были у 67 (56%) человек, а атеросклеротического у 53 (44%).

Выявленные клинико-морфологические изменения стопы были представлены гангренозными изменениями: всей стопы, в ряде случаев с переходом на н/3 голени, сегментов стопы, пальцев стопы, носившими как «сухой», так и «влажный» характер. У части пациентов некротические изменения сочетались с флегмоной мягких тканей стопы, а также гнойно-некротическими язвами дистальных отделов стопы, нередко с деструкцией костного аппарата.

При поступлении в стационар всем больным выполнялись: общеклинические методы исследования. Для оценки степени ишемии стопы и характеристики поражения артериального русла использовались: клиниче-