

1. Толстокишечный анастомоз, укрепленный губкой «ТахоКомб» в раннем послеоперационном периоде (3-7 сутки) характеризуется низкой степенью экссудативных воспалительных явлений.

2. Толстокишечный анастомоз, укрепленный губкой «ТахоКомб» в отделенном послеоперационном периоде (14-30 сутки) характеризуется низкой степенью пролиферативных воспалительных явлений.

Литература

1. Андреев, Ю.В. Восстановление непрерывности толстой кишки у больных после операции Гартмана: дисс. ... канд. мед. наук: 14.01.17 / Ю.В.Андреев. – Москва, 2012. – 160 л.

2. Артамонова, З.А. Защита кишечного шва препаратом «ТахоКомб» в неблагоприятных условиях у детей / З.А. Артамонова, Т.В. Зайцева // Вестник РГМУ. – 2008. – т. 61, № 2. – С. 181-182.

СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ПОДЪЯЗЫКА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ)

Сузанович А. И.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – ст. преп. Фёдорова М. А.*

Важное место в терминологических исследованиях занимает медицинская терминология, которая формировалась столетиями и продолжает динамично развиваться. Её стремительное развитие в последние годы, интернационализация научных медицинских исследований в разных областях требуют глубокого и всестороннего изучения механизмов номинации терминологии.

Актуальность. Изучение механизмов словообразования, выявление особенностей словообразования имён существительных в медицинской терминологии в области гастроэнтерологии представляется актуальным.

Объектом исследования являются терминологические единицы гастроэнтерологической лексики, особенности их регистрации в одноязычных и двуязычных медицинских словарях.

Цель исследования – комплексное изучение терминов подъязыка гастроэнтерологии в словообразовательном аспекте, разработка общих принципов создания двуязычного словаря гастроэнтерологических терминов.

Материалом исследования послужили термины, обозначающие основные гастроэнтерологические понятия, извлеченные методом сплошной выборки из словарей, справочников, научных статей. Экспериментальный корпус составил около 510 терминов.

Методами исследования явились: количественный анализ, метод сопоставительного анализа, описательный метод. При отборе терминов использовался прием сплошной выборки из медицинских словарей, так как в настоящее время не существует специального немецкоязычного и русскоязычного словаря гастроэнтерологических терминов.

Результаты. Словообразование является доминантным способом словообразования (85,6% исследуемых терминов). При этом 69% исследуемых терминов состоят из двух основ, 23,8% – из трёх, 7,2% – из четырёх. Важное место в распределении частоты встречаемости занимают такие способы словообразования имён существительных, как суффиксация и префиксация, на долю которых приходится 9,1% и 2,1% соответственно. В ходе исследования были выявлены также такие способы бессуффиксное образование 1,8%, субстантивация 1,4%.

ТЕЧЕНИЕ ТСАХАРНОГО ДИАБЕТА НА ПОМПОВОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ

Суманеева А.С., Алимова И.Л.

Смоленский государственный университет, Россия

Научный руководитель - д.м.н., проф. Алимова И.Л.

Актуальность: Сахарный диабет (СД) продолжает оставаться тяжелым бременем для национальных служб здравоохранения всех стран мира. Он является одной из основных причин ранней инвалидизации и высокой летальности у детей. Так, по данным Международной федерации диабета и ВОЗ во всем мире насчитывается более 200 млн больных диабетом. В настоящее время совершенствуется лечение детей с СД I типа, на данный момент это введение инсулиновых помп.

Цель изучения: изучить течение сахарного диабета на помповой инсулинотерапии у детей и оценить качество жизни пациентов после *установки инсулиновой помпы*.

Материалы и методы: Изучение включало 21 амбулаторную карту (историй болезни) детей в возрасте от 3 до 17 лет, болеющих сахарным диабетом 1 типа и находящихся на помповой инсулинотерапии. По возрастной структуре дети были разделены на 3 группы: от 3 до 7 лет (составляют 19%), от 7 до 14 лет (52,4%), от 14 до 17 лет (28,6%). Для изучения качества жизни был составлен опросник для больных сахарным диабетом, находящихся на помповой инсулинотерапии.

Результаты: Главным показателем течения сахарного диабета является уровень гликированного гемоглобина. Средний показатель гликированного гемоглобина у всех детей до установления помпы составил 8,7 %, а после установки помпы его значение снизилось и составило 8,4 %. Средний уровень гликированного гемоглобина в группе от 3-х до 7 лет до установления помпы составил 7,6 %, а после установки помпы 8,0%. В группе пациентов от 7 до 14 лет до установления помпы среднее значение глики-