

### *Литература*

1. Rate of re-interventions after transvaginal pelvic organ prolapse repair using partially absorbable mesh: 20 months median follow-up outcomes / J. Quemener [et al.]// Eur. J Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. – 2014. – V.175. – P.194-198.

2. Prolift+M Investigators. Trocar-guided mesh repair of vaginal prolapse using partially absorbable mesh: 1 year outcomes/ A.L. Milani [et al.] // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2011. – V.204(1). – P.74-78.

## **ИМПЛАНТАССОЦИИРОВАННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ**

***Сытый А.А., Ракович Д.Ю.***

*УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь  
Научный руководитель – к.м.н., доц. Нечипоренко А.Н.*

**Актуальность.** Внедрение в практику синтетических протезов для коррекции ГП и НМпН повлекло за собой появление таких осложнений в отдаленном послеоперационном периоде как миграция протеза в мочевой пузырь (МП), эрозии слизистой влагалища, нагноения в ложе или рукавах протеза.

**Целью** настоящей работы является анализ частоты и особенностей имплантассоциированных осложнений (ИАО), а так же методов их диагностики.

**Материалы и методы.** В клинике урологии ГрГМУ с 2007 по 2016 год на лечении находилось 11 женщин по поводу развившихся ИАО после хирургической коррекции ГП методом влагалищной внебрюшинной кольпопексии синтетическими протезами по принципу Proliftanterior и(или)posterior. Приведены методы диагностики этих осложнений.

**Результаты.** Миграция фрагмента протеза в МП проявлялась дизурическими расстройствами. В анализах мочи отмечалась лейкоцитурия. В ходе цистоскопии был выявлен дефект слизистой на задней стенке МП, дном которого являлся фрагмент сетчатого протеза с отложившимися на нем солями.

МРТ таза уточнила особенности положения протеза и наличие дефекта в стенке МП.

Эрозия слизистой влагалища клинически проявлялась незначительными болями во влагалище, скудными геморрагическими выделениями.

При влагалищном исследовании выявлен язвенный дефект на передней или задней стенке влагалища. Дном язвенного дефекта являлся фрагмент сетчатого протеза.

*Нагноение в ложе протеза Prolift и каналах его рукавов.* Это осложнение клинически проявлялось умеренными гнойными выделениями из ранки в стенке влагалища.

Пациенткам выполнена МСКТ таза после введения в свищевое отверстие в стенке влагалища. На томограммах контрастированы ложе протеза и канал его рукава.

**Вывод.** Анализ жалоб пациентки, информация о методе проведенной ранее операции и осмотр позволяют диагностировать ИАО осложнение. Специальные методы исследования позволяют уточнить особенности положение импланта наметить план адекватного лечения.

## **ВЛИЯНИЕ АКУШЕРСКОГО АНАМНЕЗА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН**

*Сытый А.А., Сытая К.О., Ракович Д.Ю.*

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь*

*Научный руководитель – д.м.н., доц. Сурмач М.Ю.*

**Актуальность.** Материнство является одной из важнейших сторон жизни любой женщины, но в последние годы появляется тенденция к снижению количества детей в семье. Большинство женщин молодого возраста указывают «материальное положение» одной из основных причин искусственного прерывания беременности, а также как одну из наиболее субъективно значимых потенциальных угроз качеству жизни после рождения ребёнка [1].

**Цели и задачи.** Оценить и проанализировать влияние беременности и родов на качество жизни женщины, а также выработать возможные подходы к улучшению качества жизни женщин.

**Материалы и методы.** В основную группу было включено 302 женщин, пациенток стационаров, в возрасте от 21 до 27 лет. Они были разделены на 3 группы. В первую группу включено 99 женщин, которые не были беременны и не рожали. Вторую группу составили 102 женщины, у которой уже были роды. Третья группа складывалась из 101 уже родившей женщины, у которой после родов прошло не более 48 часов. Для исследования качества жизни проводилось однократное анкетирование по международной методике с помощью краткого опросника WHOQOL-BREF [2].

**Результаты исследования.** Качество жизни является многокомпонентным понятием. В данной работе мы остановились на нескольких, на наш взгляд, наиболее значимых с позиции реализации цели исследования, составляющих опроса. Определяющими стали данные ответа на вопрос «Как вы оцениваете качество своей жизни?». Во всех группах абсолютное большинство женщин оценили качество своей жизни как хорошее. Однако в первой группе (не рожавшие) доля женщин, выбравших данный вариант ответа, была статистически значимо минимальной (54%,  $p < 0,001$ ), во второй (рожавшие) – 88%, в третьей группе – 75%. Ни одна женщина из всех