

групп не выбрала варианты ответа «плохо» или «очень плохо». В то же время, на вопрос «Насколько Вы довольны собой?», в первой (не рожавшие) и третьей группа абсолютное большинство женщин довольны собой (100%), во второй (рожавшие) – 68% довольны и 32% не довольны собой. Эти данные не могут однозначно быть связаны с тем, является ли женщина матерью, и говорят о резерве повышения качества жизни у женщин. В этой связи интересным являются результаты изучения факторов удовлетворённости женщин качеством и доступностью медицинской помощи. Большинство респонденток оказались удовлетворены или очень удовлетворены оказанной им медицинской помощью – 87%. Из числа давших отрицательные оценки, 30 человек (30,3%, максимальная доля, $p < 0,05$) из первой группы и 10 человек (9,9%) из третьей. Такие оценки женщины объяснили трудностями с записью на прием к врачу поликлиники (72%), некомпетентностью медицинского персонала (8%), недоверием к медицинским работникам (13%), другие варианты (7%).

Выводы. Самооценка качества рожавших молодых женщин значимо выше таковой у не имевших беременности и родов. Несмотря на то, что никогда не имевшие беременности женщины в основном “довольны собой”, среди них наиболее высока доля тех, кто дал отрицательные оценки качеству и доступности медицинской помощи.

Литература

1. Сурмач, М.Ю. Дети, брак, семья глазами молодёжи Беларуси /М.Ю. Сурмач //Современная молодёжь и общество. Сборник научных статей. Вып. 3. Молодёжь в условиях новых вызовов информационно-коммуникационного общества. – Минск: РИВШ, 2015. – С. 67 – 71.

2. http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/whoqolbref/ru/

АНАЛИЗ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ЛАРИГОТРАХЕИТА ПО ШКАЛЕ УЭСТЛИ

Сытый А.А., Ракович Д.Ю.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., доц. Байгот С.И.

Актуальность. Стеноз гортани - это угрожающее жизни заболевание верхних дыхательных путей, которое может приводить к неблагоприятному исходу. В практической работе очень важна диагностика степени выраженности стеноза гортани. В связи этим необходим поиск более точных и достоверных методов диагностики тяжести стеноза гортани у детей сострым стенозирующим ларинготрахеитом (ОСЛТ). В международной практике для оценки тяжести стеноза гортани используется шкала Уэстли (индекс Уэстли) [1].

Цели и задачи. Оценить степень тяжести острого стенозирующего ларинготрахеита у детей с помощью шкалы Уэстли.

Материалы и методы. Обследовано 124 ребенка (85 мальчиков и 39 девочек) с ОСЛТ в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, находившихся на лечение в пульмонологическом отделении УЗ «ГОДКБ». В возрасте от 6 месяцев до 1 года было 54 ребенка, от 1 года до 3 лет – 52 ребенка, от 3 до 5 лет – 18 детей. Критерии оценки степени тяжести ОСЛТ проводились по шкале Уэстли.

Достоверность показателей оценивали по методу Хилла.

Результаты исследования. Стеноз гортани по шкале Уэстли среди всех обследованных детей отмечался у 88 (71%) пациентов с ОСЛТ. Стеноз гортани легкой степени был выявлен достоверно чаще у 72 (58,6%) детей, средней степени тяжести – у 16 (11,3%) пациентов, $p < 0,01$. Тяжелый стеноз был выявлен ни у одного обследованного ребенка. В зависимости от степени тяжести у детей первого года жизни стеноз гортани I степени был выявлен у 30 (55,6%) детей, стеноз II степени – у 7 (12,6%). В возрасте от 1 года до 3 лет стеноз гортани I степени отмечался у 38 (73,1%) детей, II степени – у 4 (7,7%) пациентов. У детей в возрасте от 3 до 5 лет стеноз I степени диагностирован у 4 (22,2%) детей, стеноз гортани II степени – у 5 (27,8%) детей, при использовании клинических характеристик ни у одного ребенка не установлен стеноз II степени в данной возрастной группе.

Выводы. Наиболее часто по шкале Уэстли диагностируется стеноз гортани I степени у детей первых трех лет жизни с острым стенозирующим ларинготрахеитом. Использование шкалы Уэстли для оценки степени тяжести ОСЛТ у детей позволяет более точно установить наличие стеноза и его степень тяжести, что может быть использовано в клинической практике.

Литература

1. Когут, Т.А. Современные рекомендации по лечению стенозирующего ларинготрахеита у детей / Т.А. Когут, Л.И. Мозжухина, Н.П. Ганичева, Л.Г. Емеличева // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2014. – Т. 16. - №5(2). – С. 718-722.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕВАЕМОСТИ У УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА С РАЗНОЙ САМООЦЕНКОЙ

Тарчинская К.С.

*Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Беларусь
Научный руководитель – к. психол. н., доцент Карнелович М.М.*

Актуальность. Проблема мотивации достижения в настоящее время приобретает особое значение в системе непрерывного профессионального образования. Субъект, характеризующийся высокой мотивацией достижения, готов к преодолению многих трудностей, возникающих в процессе обучения, стремится к саморазвитию, настойчив в достижении целей.