

- Иванова, Г. Е. Реабилитация больных с травматической болезнью спинного мозга / Г. Е. Иванова, В. В. Крылов, М. Б. Цыкунов и др. – М.: ОАО «Московские учебники и Картолитогрфия», 2010. – 640 с.

РОЛЬ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ УЗ «ГКБСМП Г. ГРОДНО» ЗА ПЕРИОД 2013 – 2015 ГГ.

Кашлей С.И., Паулич Ю.П.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра анестезиологии и реанимации

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Губарь В.В.

Актуальность. На сайте МЗ РБ представлены цифры летальности пациентов с отравлениями алкоголем, наркотическими, психотропными веществами и прослеживается рост в динамике. Поэтому проблема острых отравлений на данный момент остается актуальной и требует более детального изучения.

Цель исследования: оценить динамику и эффективность оказания помощи пациентам токсикологического профиля и отделения реанимации с отравлениями различного генеза за период 2013–2015 годов.

Методы и методы. Результаты получены на основании ретроспективного анализа документов токсикологического отделения у пациентов с острыми отравлениями.

Результаты. Сравнив данные за вышеуказанный период, можно отметить увеличение количества всех отравлений с 624 случаев в 2013 году до 666 в 2014 году и 759 случаев в 2015 году. Увеличилось количество алкогольных интоксикаций и отравлений от суррогатного алкоголя с 353 случаев (56,5% от всех отравлений) в 2013 году до 454 (68,1% от всех отравлений) в 2014 году и 550 случаев (72,4% от всех отравлений) в 2015 году. Наблюдается существенный рост наркотических отравлений с 39 (6,25% от всех отравлений) в 2013 году до 65 (9,7%) в 2014 году и 46 случаев (6% от всех отравлений) в 2015 году. Увеличилась склонность к суицидальным попыткам. Так в 2013 году было зарегистрировано 50 случаев, а в 2014 их увеличилось до 64, в 2015 году 51 случай. Что возможно связано с эмоционально-психологическим напряжением на фоне существующего кризиса в обществе. Однако отмечается снижение случаев острых медикаментозных отравлений с 167 случаев (26,8 от всех отравлений) в 2013 году до 110 случаев (16,5% от всех отравлений) в 2014 году и 113 случаев (14,9% от всех случаев) в 2015 году. Положительная динамика и в структуре летальности. В 2013 году было зарегистрировано 2 случая летального исхода от острых медикаментозных отравлений, а в 2014 и 2015 годах они отсутствовали. От отравления алкоголем и его суррогатами умерло по одному человеку в 2013 и 2014 годах и два человека в 2015 году. От отравления неизвестным ядом в 2013 году умерло 6 человек, в 2014 один, а в 2015 году 3 человека. Структура летальности за весь 2013 год от острых отравлений составила 11 человек, за 2014 два человека, а за 2015 год 5 человек. Это свидетельствует об эффективности совместных усилий медицинской помощи и органов правопорядка по предупреждению этих явлений.

Выводы. Пропаганда и организационные мероприятия могут быть более эффективными при условии более активной агитации здорового образа жизни среди населения и дальнейшего совершенствования медицинской помощи (методики ранней диагностики, оснащение необходимыми реактивами и аппаратурой).

Литература:

- Маркова, И. В. Отравления в детском возрасте. / И. В. Маркова, А. М. Абезгауз // изд. 2-е, исправленное и дополненное. - Л.- Медицина.- 1977.- 272 с.
- Медицинская токсикология. Национальное руководство. Москва ГЭОТАР – медицина 2012.-345 с.