

## ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ И КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ОРГАНИЧЕСКИХ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Личко Е.А., Шинтарь А.В., Мартинович М.П., Олешкевич В.В.  
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  
Кафедра психиатрии и наркологии  
Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Карпюк В.А.

**Актуальность.** Психические и поведенческие расстройства являются весьма распространенными и поражают более 25% всех людей в определенные периоды их жизни. Около 79% всех психиатрических диагнозов составляют тревога и депрессия. Повышение продолжительности жизни приводит к росту числа психических расстройств, обусловленных повреждением головного мозга. В связи с этим представляется значимым изучение распространенности, структуры, особенностей клинических проявлений, течения, отклика на психофармакотерапию и прогноза органических аффективных расстройств.

**Цель:** оценить демографические показатели и клинико-психопатологические особенности у пациентов с органическими аффективными расстройствами.

**Методы исследования.** Проведен анализ журналов учёта госпитализированных и выписанных пациентов Гродненского областного клинического центра «Психиатрия-наркология» за период 2011–2015 гг. с последующей обработкой данных. Выбраны все случаи с диагнозом F06.3 – органическое аффективное расстройство (согласно Международной классификации болезней 10 пересмотра).

**Результаты и выводы.** За изученный период на стационарном лечении по поводу органического аффективного расстройства находилось 24 пациента. Из них мужчины составили – 83,3% (20 чел.), женщины – 16,7% (4 чел.). По возрасту все пациенты распределились следующим образом: от 30 до 45 лет – 7 (29,2%) пациентов, от 46 до 59 лет – 6 (25%) пациентов и старше 60 лет – 11 (45,8%) пациентов. Средний возраст среди мужчин составил – 58 лет, из которых в возрасте от 30 до 45 лет – 6 (30%), от 46 до 59 лет – 5 (25%) и старше 60 лет – 9 (45%). Среди женщин средний возраст также составил 58 лет, в том числе в возрасте от 30 до 45 лет – 1 чел. (25%), от 46 до 59 лет – 1 чел. (25%), старше 60 лет – 2 чел. (50%). Ведущей причиной органического поражения головного мозга в возрастной группе старше 60 лет была сосудистая патология (сахарный диабет, артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов головного мозга, инфаркт мозга). В возрасте от 30 до 45 лет чаще встречалось органическое повреждение сочетанного генеза – травматического, дисметаболического, сосудистого. В 29% случаев наряду с соматической патологией имел место синдром зависимости от алкоголя. У большинства находившихся на лечении было диагностировано органическое депрессивное расстройство умеренной степени тяжести. В трех случаях на фоне тяжелой депрессии с психотическими включениями пациенты совершили суицидальную попытку. В клинической картине преобладала вязкость аффективных симптомов. Для достижения устойчивой ремиссии требовалось назначение нескольких препаратов из разных психофармакологических групп.

### **Выводы:**

1. Органическое аффективное расстройство чаще встречается у мужчин старше 60 лет.
2. В структуре органических аффективных расстройств преобладает депрессия умеренной степени тяжести, чаще с сосудистым генезом повреждения головного мозга.
3. Для достижения устойчивой ремиссии необходимо назначение лекарственных средств разных психофармакологических групп.