

ОЦЕНКА СВЯЗИ УРОВНЯ КОМПЛАЕНСА СО СТЕПЕНЬЮ ВЫРАЖЕННОСТИ НЕГАТИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ

Мартусевич А. В., Дегтярёва Д.Ю.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра психиатрии и наркологии

Научный руководитель ст. преподаватель кафедры Ассанович М. В.

Актуальность: Достижение комплаенса в психиатрии является важнейшей составляющей преемственности и успешности терапевтического процесса. Соблюдение пациентом предписанного режима лечения позволяет увеличить сроки ремиссии и сократить количество госпитализаций, снизить глобальное экономическое бремя расстройства.

Цель: оценить связь между выраженностью негативной симптоматики и уровнем комплаенса у пациентов с шизофренией, оценить связь между выраженностью негативной симптоматики, уровнем комплаенса и социально-демографическими характеристиками у пациентов с шизофренией.

Материалы и методы. Контингент испытуемых: 30 пациентов с диагнозом шизофрении мужского и женского отделений ГОКЦ «Психиатрия-наркология». Пациентов мужского пола – 10, женского – 20, в возрасте от 22 до 35 лет – 6 человек, от 36 до 50 – 10, от 51 до 75 – 14. Диагноз параноидная шизофрения - 22 пациента, простая – 7, кататоническая – 1. 18 пациентов имеет непрерывный тип течения, 12 – приступообразный. Методы исследования: катamnестический, анкетирование с целью сбора социально-демографических данных, опросник «Оценка инсайта и отношение к лечению», «Протокол оценки синдрома дефицита», методы корреляционного анализа.

Результаты исследования. Среднее значение уровня комплаенса испытуемых $M = 13,1$ (стандартное отклонение = 6,3).

Среднее значение уровня выраженности негативной симптоматики $M=10,0$ (стандартное отклонение = 7,3).

С помощью корреляционного анализа установлена отрицательная высокая связь между уровнем выраженности негативной симптоматики и уровнем комплаенса ($r=-0,80$; $p<0,001$).

С помощью корреляционного анализа установлена отрицательная высокая связь между уровнем выраженности негативной симптоматики и наличием высшего образования ($r=-0,74$; $p<0,001$).

Установлена положительная корреляционная связь между уровнем комплаенса и наличием высшего образования ($r=0,77$; $p<0,001$).

Выводы: Оценка связей между уровнем комплаенса, степенью выраженности негативной симптоматики и уровнем образования у пациентов, страдающих шизофренией, позволяет сделать следующие выводы.

1. Между уровнем комплаенса и степенью выраженности негативной симптоматики существует отрицательная связь.
2. Между степенью выраженности негативной симптоматики и уровнем образования обнаруживается отрицательная связь.
3. Уровень образования положительно связан с уровнем комплаенса.
4. Связь уровня комплаенса с возрастом и полом в процессе проведенного исследования не обнаружена.