

МАТЕРИАЛЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
К 110-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ
Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета
имени академика И.П. Павлова

Санкт-Петербург, 10 декабря 2010 г.

Санкт-Петербург

2010

экспериментально обоснован учениками И.П. Павлова — В.А. Крыловым и Н.А. Подкопаевым — и привел к появлению условно-рефлекторной апоморфинотерапии алкоголизма, предложенной И.Ф. Случевским в 1933 году.

5. В дальнейшем методы условно-рефлекторной терапии комбинируются с гипносуггестивными методами. Важнейшими чертами советской коллективной психотерапии были тесная связь с трудотерапией, строго клиническая направленность в сочетании с индивидуальным подходом.

6. Психотерапия, проводимая в различных видах и формах, является основным компонентом комплексного лечения алкоголизма и составляет основной фон, на котором базируются специфические методы лечения.

Современная эпидемиологическая ситуация по наркозависимости и ВИЧ в Республике Беларусь

С.А. Игумнов¹, Э.П. Станько²

¹ Республиканский научно-практический центр психического здоровья, г. Минск,

² Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь

В Республике Беларусь с 2004 по 2009 год на 21% увеличилась численность больных наркоманией, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, и на 13,4% — ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков (ПИН). Также наблюдается рост заболеваемости наркоманией в 2,7 раза и ВИЧ-инфекцией в 1,4 раза. Одним из основных эпидемических факторов, определяющих распространение ВИЧ-инфекции в Беларуси, является активация путей передачи инфекции, в том числе через распространение наркомании, оказывающее непосредственное влияние на заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди населения. Работа по выявлению ВИЧ-инфекции среди больных наркоманией является эффективным средством для выявления скрытой заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди населения. Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди ПИН свидетельствует о тенденции к уменьшению роли парентерального пути распространения, связанного с введением наркотиков, и возрастанию значимости гетеросексуальной передачи инфекции.

В таких условиях обеспечение финансовых и организационных вложений в программы профилактики и лечения наркоманий, особенно в случае присоединения ВИЧ-инфекции, возможно при наличии точных и постоянно обновляемых данных эпидемиологической статистики, для чего важным является регулярное проведение популяционных исследований, изучающих медико-социальные последствия наркомании, ВИЧ-инфекции и ПИН, страдающих ВИЧ.