

Результаты. В ходе исследования установлено, что судорожный синдром отмечался у пациентов инфекционного стационара с общей частотой $19,2 \pm 1,1\%$ от числа поступавших в отделение реанимации. Среди пациентов чаще встречались лица мужского пола – $55,1 \pm 5,2\%$. По возрастному составу чаще судороги отмечались у детей – $89,7 \pm 3,0\%$. Среди детей наиболее многочисленной группой пациентов были дети в возрасте от 1 года до 5 лет ($80,2 \pm 4,1\%$). Судороги у детей первого года жизни отмечались с частотой $3,3 \pm 1,8\%$. У детей от 6 до 10 лет судороги регистрировались в $8,8 \pm 3,0\%$. У детей с 11 до 18 лет судороги встречались с частотой $2,2 \pm 1,5\%$ и всегда были на фоне нейроинфекций. У взрослых в возрастной группе от 19 до 40 лет судороги встречались с частотой $7,0 \pm 2,6\%$ от общего числа пациентов с судорожным синдромом, причём у $57,1 \pm 18,7\%$ пациентов этой группы судороги возникали на фоне синдрома зависимости от алкоголя (далее СЗА). Пациенты в возрасте 40-60 лет составили $3,0 \pm 1,7\%$ от общего числа больных. $2/3$ этих пациентов имели СЗА, а у $1/3$ судороги связаны с эпилепсией. Судороги на фоне ОРИ встречались у $69,0 \pm 4,6\%$. Судороги на фоне ОКИ составили $18,0 \pm 3,8\%$ от общего числа пациентов с судорожным синдромом. Судороги на фоне нейроинфекций отмечены у $9,0 \pm 2,9\%$ пациентов.

Выводы. Наибольшее количество пациентов с судорожным синдромом – дети в возрасте 1-5 лет с фебрильными судорогами на фоне ОРИ. У взрослых судорожный синдром чаще отмечался на фоне СЗА.

Литература

1. Карлов, В.А. Неотложная помощь при судорожных состояниях / В.А. Карлов, А.А. Лапин. – М.: Медицина, 1982. – 144с.

ОЦЕНКА МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ РАННЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Амельянович А.В.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Смолей Н.А.*

Актуальность. Нарушение менструального цикла (НМЦ) – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний в гинекологической практике, возникающее на фоне различных патологических состояний. НМЦ значительно влияет на работоспособность, эмоциональное состояние пациентов, усугубляет имеющуюся экстрагенитальную патологию и часто приводит к развитию других гинекологических заболеваний [1].

Цель. Оценить состояние менструальной функции у пациентов раннего репродуктивного возраста и установить её связь с экстрагенитальной патологией и гинекологическими заболеваниями.

Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование 134 пациентов в возрасте от 17 до 24 лет. Для однородности исследования были выбраны пациенты со сходными условиями проживания и труда.

Результаты. Все обследованные пациенты являлись студентками медуниверситета и были сопоставимы по таким критериям, как возраст, рост, вес, условия проживания, продолжительность учебного дня. Частота экстрагенитальной патологии составила 14,9%. Гинекологические заболевания встречались в 22,4% случаев, среди которых чаще всего имели место эрозия шейки матки, миома матки и кольпит. При исследовании менархе установлено, что у 21,6% пациентов менструальный цикл установился сразу после менархе, у 54,5% девушек – в течение года, в то время как 23,9% участниц отметили нерегулярный характер менструального цикла. Выявлено, что 37,4% участниц опроса не испытывают болезненных ощущений во время месячных, в то время как 62,6% девушек оценивают боль как сильную, мешающую деятельности и требующую постельного режима. Установлено, что для купирования болевого синдрома наиболее часто использовались такие лекарственные средства, как метамизол натрия, кеторолак и дротаверин.

Выводы. Частота заболеваний репродуктивной системы обследованных пациентов оказалась в 1,5 раза выше, чем экстрагенитальной патологии. Большинство исследуемых пациентов (76,1%) имели регулярный менструальный цикл. В то же время, у 62,6% девушек менструации сопровождались болезненными ощущениями, снижающими работоспособность и эмоциональное состояние, что требовало адекватной медикаментозной коррекции.

Литература

1. Пересада, О. А. Концепция дисменореи и современные лечебные подходы: опыт применения «Спазмалгона» / О. А. Пересада // Репродуктивное здоровье: Восточная Европа. – 2016. – Т. 6. – № 3. – С. 403–410.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ЭКТОПИИ У НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН ДО 25 ЛЕТ

Андралойть Е.М., Станько Д.Э.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – д.м.н., профессор Гутикова Л.В.*

Актуальность. Цервикальная эктопия является наиболее частым процессом на шейке матки, неосложненная форма которого рассматривается как вариант нормы. В 54,2% случаев эктопия шейки матки выявляется в группе молодых женщин до 25 лет, у женщин до 35 лет частота встречаемости цервикальной эктопии составляет 89,3% [1].