

Результаты. При проведении ультразвуковой визуализации «акустическое окно» у 2 пациентов найдено в левом подреберье, у 3 – в эпигастральной области. Дальнейший висцеролиз проводился под контролем лапароскопа. Пациентам было проведено 4 лапароскопических холецистэктомий и 1 лапароскопическая аппендэктомия. Послеоперационный период в дальнейшем протекал без осложнений.

Выводы. Ультразвуковой метод визуализации обеспечивает возможность безопасной пункции передней брюшной стенки. Данный метод является неинвазивным, простым в применении, позволяет снизить вероятность конверсий у пациентов со спаечным процессом в брюшной полости.

Литература

1. Метод узи-контролируемого этапа наложения карбоперитонеума при лапароскопическом рассечении спаек брюшной полости: утв. М-вом здравоохранения Республики Беларусь 20.05.16.- Минск, 2016 г.- 6 с.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

Гуламова А.В., Труховская Д.Д.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель-доцент, д.м.н. Сурмач М.Ю.*

Актуальность. Опущение и выпадение внутренних половых органов - одна из часто встречающихся в гинекологической практике патологий, которая не имеет тенденции к снижению [1]. В Беларуси каждая пятая пациентка, обратившаяся к гинекологу, предъявляет жалобы, связанные с опущением половых органов [2].

Цель. Разработать программу исследования по теме «Качество жизни женщин с пролапсом тазовых органов», которая даст возможность обосновать медико-социальные меры, направленные на повышение эффективности лечения и реабилитации данной категории пациенток, на примере Гродненской области.

Материалы и методы. Для разработки программы проведен информационный поиск. В анализ включены работы отечественных и зарубежных авторов, иллюстрирующие распространенность патологии, подходы к лечению, влияние на факторы качества жизни (КЖ), методики по изучению КЖ. Учтены особенности Гродненского региона, являющегося приграничным с Польшей и Литвой.

Результаты. По мере развития патологического процесса усугубляются функциональные нарушения, резко снижающие КЖ женщин, особенно после 50 лет. Изменения КЖ происходят как в физическом, так и в психологическом компоненте. Обращаемость за медицинской помощью ниже распространенности патологии. Проблема недостаточно изучена и является

актуальной и в других странах мира. Для изучения КЖ могут использоваться как авторские, так и унифицированные ВОЗ методики. Для цели нашего исследования наиболее пригоден адаптированный к белорусским пациенткам инструментарий польских авторов «Ankietadlakobiet w wieku 45-60 lat», основанный на ВОЗ-опроснике SF-36.

Выводы. При сопоставлении данных опроса женщин, имеющих пролапс тазовых органов, и контрольной группы, а также сравнении Гродненского и других регионов мы планируем достичь цели исследования и разработать меры для повышения КЖ женщин в Гродненском регионе.

Литература

1. Дифференцированный подход к выбору методики хирургического лечения пролапса тазовых органов / А.А. Куликов., О.А. Пересада, А.Н. Барсуков, С.В. Соловей, В.П. Кириленко // *Здравоохранение.* – 2014. - №11. – С. 56 – 63.

2. Проблема опущения тазовых органов у женщин: современные возможности профилактики в родах / О.А. Пересада, А.Н. Барсуков, А.А. Куликов, Н.А. Одинцова, Л.З. Шереметьева // *Медицинские новости.* – 2010. - №10. – С. 35–40.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ РАЗРЫВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ НЕДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Гуламова А.Н., Чернецкая Ю.Е.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – доцент, к.м.н. Савоневич Е.Л.*

Актуальность. При преждевременном излитии околоплодных вод и отсутствии родовой деятельности при сроке 22-34 недель гестации, отсутствии признаков инфекции, тяжелой экстрагенитальной и акушерской патологии у матери, хорошем состоянии плода и в соответствии с клиническими протоколами можно попытаться пролонгировать беременность. Это обосновано отсутствием готовности матки и особенно ее шейки к родам, трудностями индукции родовой деятельности, необходимостью проведения профилактики респираторного дистресс-синдрома у плода. В то же время установлено, что само преждевременное излитие вод способствует «созреванию» легких плода. Подобная тактика ведет к снижению перинатальной смертности.

Целью настоящего исследования явилась оценка исходов родов при пролонгировании недоношенной беременности, осложненной преждевременным разрывом плодных оболочек.