

восьми случаях выявлена одна СВ, в трех – две. VIII сегмент расположен в верхних отделах правой доли печени и на нижнюю ее поверхность не переходит. Правая ветвь ВВ дает к VIII сегменту 1 – 2 СВ диаметром 4 – 7 мм, причем, две вены выявлены только в одном случае.

**Выводы.** Высокая вариабельность ветвления ВВ для ряда сегментов (I, IV, V) значительно усложняет возможности их анатомической резекции, а месторасположение отдельных сегментов (VIII) делает эту операцию в значительной мере трудновыполнимой. Знание вариантов интраорганной архитектоники СВ может способствовать снижению интраоперационных осложнений и послеоперационной летальности.

#### *Литература*

1. Намазов, Ф.У. Особенности портального кровоснабжения задненижних сегментов печени / Ф. У. Намазов, Д. В. Казаковцев, В.А. Журавлев // Вятский медицинский вестник. – 2006. – № 2. – С. 93-94.

## **ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОК ОБ ОБРАЗЕ ЖЕНЩИНЫ**

*Кисель Н.П.*

*Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь*

**Актуальность.** В последнее время особую популярность приобрели исследования, связанные с изучением представлений об образе современных мужчины и женщины. На наш взгляд, интерес к данному вопросу связан с тем, что у современной молодежи данные образы достаточно размыты и не имеют четких границ, что может привести к ряду сложностей в установлении продуктивных взаимоотношений с представителями противоположного пола, реализации своего потенциала в профессиональной сфере и т.д.

**Цель** – определение степени выраженности гендерных характеристик в структуре Я-концепции личности современных студенток.

**Материалы и методы исследования.** В данном исследовании принял участие 41 респондент: студентки факультета искусств и дизайна, педагогического и филологического факультетов. Средний возраст испытуемых – 20,6 года. В качестве средства диагностики использовался опросник «Кто я?», авторы М. Кун и Т. Макпартленд [3, с. 5–9]. Для обработки данных был использован метод описательной статистики (вычисление среднего арифметического значения).

**Результаты.** В процессе изучения гендерных характеристик в структуре Я-концепции личности выявлено, что у респондентов доминируют категории: «другие социальные роли» (M= 2,93), то есть роли, которые касаются сферы досуга и «нейтральные характеристики» (M= 12,19), обозначающие личностные

черты, не включаемые в стереотипные гендерные характеристики. Такие категории, как «феминные характеристики» ( $M=2,17$ ), включающие черты, традиционно приписываемые образу женщины, и «маскулинные характеристики» ( $M=0,66$ ), подразумевающие черты личности, стереотипно связанные с образом мужчины, выражены незначительно.

**Выводы.** Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что в структуре Я-концепции личности современных студенток низкая степень выраженности гендерных характеристик, что свидетельствует об отсутствии у них четких границ образа современной женщины.

#### *Литература*

1. Психодиагностические методики изучения гендерных особенностей личности [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для студентов, обуч. по специальностям 1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)» и 1 - 23 01 04 «Психология» / сост. Е. Д. Беспанская-Павленко. – Минск : БГУ, 2013. – Режим доступа <http://elib.bsu.by/bitstream>. – Дата доступа: 10.02.2018.

## **ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС**

***Кисель А.Н., Метнер М.В.***

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Заборовский Г.И.*

**Актуальность.** Ожирение – это хроническое рецидивирующее заболевание, которое способствует проявлению и развитию многих других болезней. Накапливаются данные об участии расстройств жирового обмена в формировании нарушений женской репродуктивной функции. Однако взаимосвязи ожирения и расстройств женского репродуктивного здоровья, механизмы этой связи до сих пор изучены недостаточно [1].

В связи с этим **целью** данного исследования явилось изучение особенностей течения беременности и родов у женщин с ожирением.

**Материал и методы исследования.** На базе перинатальных центров проведен ретроспективный анализ историй родов и обменных карт женщин за период с января 2015 по июнь 2017 года. В исследовании принимало участие 57 пациентов в возрасте от 19 до 40 лет. В зависимости от степени ожирения все беременные были подразделены на три группы: первую составили пациентки с 1-ой степенью ожирения (ИМТ 30-34,9) – 59,6%, вторую – со 2-ой степенью ожирения (ИМТ 35-39,9) – 21,1% и третью – с ожирением 3-ей степени (ИМТ 40 и более) – 19,3%. Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакета прикладных программ Statistica 6,0.

**Результаты.** Средний вес у женщин – 95 кг, средний рост 167,5 см, средний ИМТ – 35,1. Средний гестационный срок составил 273 дня,